

Sondertabelle für die Z4-Serie

Allgemein sollte "Z" bei Säuglingen NICHT eingesetzt werden !

Sollte es dennoch von Nöten sein, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

Tips:

Säuglinge haben oftmals das Problem mit der Verdauung.  
Die Stuhlfarbe sollte ocker, der Stuhl cremig sein. Wenn die Färbung einmal braun wird, kann das ein Zeichen für Bakterien oder Pilzbefall sein, sofern die Nahrung nicht verändert wurde. Innerhalb der nächsten Tage wird es zu Koliken und Schreianfällen kommen.

Abhilfe:

Bauchwehtee von Milupa, oder Fencheltee.  
Z einsetzen. Kontaktort: Fußballen des Säuglings.  
Die Elektroden in die eigenen Hände nehmen und die Daumen die Fußballen des Säuglings nehmen.  
In der letzten Minute kann der Kontakt der Elektroden auf die Fußballen direkt vorgenommen werden.  
Maximale Anwendung: 2 x pro Tag, nicht länger als 3 Tage.  
Falls das Kind sehr unruhig ist, kann das im Schlaf durchgeführt werden.  
Es sollte für mindestens 7 Tage sofort auf Milupa Heilnahrung umgestellt werden. Bei Durchfall, Elektrolyt-Zusatz benutzen.  
An den Händen ist das ebenso möglich, sofern durchführbar.  
Sofortige Kontrolle der Nahrung ist wichtig, achten Sie auf Säuerungserscheinungen der Nahrung. Es darf keine Säuerung innerhalb von 24 Std. auftreten.  
Ist das so, stellen Sie die Nahrung auf Milupa Aptamil Pre LCP um.  
Fügen Sie 2/5 tel Anteil Milchzucker hinzu, damit Ihr Kind satt wird.

Zeitentabelle:

1 Phase	Pause	2 Phase	
3-6 min.	30-40 min.	6-8 min.	der Rest entfällt !

Max. 2 x pro Tag, nicht länger als 3 Tage !

Teemischung:

120 ml Kamillentee (Teewasser vor dem abkochen tachyonisieren)  
4 Tropfen Bismutum Subnitricum D6  
4 Tropfen Esberitox  
4 Tropfen Enteralen  
1 Fingerhut Aloa-Vera geschmacklos (Die Fasern bitte zerstampfen)

Schnuller mit mittelgroßem Saugloch einsetzen.

## Sondertabelle für Z in der Schwangerschaft

Allgemein sollte in der Schwangerschaft "Z" möglichst nicht eingesetzt werden !

Es gibt aber Ausnahmesituationen, wo "Z" das "kleine Übel" gegenüber den normalen Medikamenten ist.

Generell sollte "Z" maximal 2 x am Tag und nicht länger als 3 Tage eingesetzt werden.

Die Sitzungszeiten:

1 Phase	Pause	2 Phase	Pause	3 Phase
6-8 min.	20 min.	8-12 min.	20 min.	6-8 min.

Bitte überschreiten Sie nur in Notfällen die o.a. Sitzungszeiten !

Achten Sie dabei auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr, am besten gefiltertes, tachyonisiertes Wasser.